Biancolella verace (par erreur)

OMtp120

Collection Vassal-Montpellier

STAN TO THE WAY OF THE PARTY OF

Biancolella verace 7. 16 59







DESIGNATION: Biancolella Verace (54) CLOS 1 PLANCHE 19 RANG S Southe 4 Vigueur : 3,5 PORT : éris - ¿ éris - couché Hillerandage: 0,5 Date de Véraison : 6 -8 -80 Date de Maturité: 99,80 Pourriture : 0 <u>GRAPPE</u>: G - M - P: D - M - C BAIE: TG - G- H - P LOATS disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : 5 - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : \inc. |- coloré

Juntanianta

DESIGNATION: Biancolella verace

CLOS / PLANCHE / RANG S Souchel

Vigueur: 25

PORT: cris - ½ éris - couché

Millerandage: 3

Date de Véraison: 26 % 82

Pour de Haturité: 24,882

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - (P): L - M - C

BAIE: TG - G - M - P 17 x15

disc. - Sph. cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.

GOULTUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAYLUR: (S) - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE:

ST avec pépins - apyrène

SA 1 JUS: inc. - coloré

JUS: inc. - coloré

CLOS 7 RANG 16 Souche S9 DESIGNATION: Brancollla verace HARGE: Année : Varaison : Pour.: 0 Muturité : 149-87 Mall. :4 HRAPPE : G - M - P - Dim .: 14 Jueur : 3 10FT: érig - 1/2 érig - couché Année : TG - G-M- P - Dim.: 1917 disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N. GAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. At H Avec pepins - apyrène JUS : inc. /- coloré 35 4

RANG 16 Souche 5 9 TENTION: Bianwella verace Année ; 1.8 strateon s Malurité : 2 Pour .: 1 TO LE : G - M FO - Dim.: 13 Manour: 2,5 FORT : érig - (1/2 érig - couché DATE 2 Année : mg - g - M) - P - Dim. : 18x17 dasc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. GUTLOUP : BI - Gr - Rs - Rg - N. = 0 VELIR : (s) - m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène JUS | inc. - coloré

Année: 1977
Emplacement 1. 19.84 A. Désignation Biancolella verace

| | Nombre ! | DATES | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------|----------|-----|---------|-------------------|--|--|--|--|
| | d'yeux! | 7-3 | 110.3 | 153 | ! | !!!!!! | nd book phay been | | | | |
| × | !!!!! | | ! | ! | 1 | ! | | | | | |
| Ø | !!!!! | : | ! ! | 1 | ! | | | | | | |
| 8 | 1 1 | | 1 | ! | ! | | | | | | |
| 4 | 14 ! | 1 | ! | 1 4 | ! | | | | | | |
| X | | | ! | .! | | | | | | | |
| ==000 | | ===== | | ======== | ple | 13-3-天元 | 4 | | | | |

Junturhunta Junturhunta

Année: 1978
Emplacement ... 1 - 19 84 84. Désignation Biancalella ...
Vera ce

| | Nombre Total | | D A | DATES | | | | | | |
|-----|-----------------|------|-----|-------|---|----|--|--|--|--|
| | d'yeux | 13 3 | ! | ! | ! | ! | | | | |
| 4 | ! | ! | ! | ! | ! | į. | | | | |
| 2 | 1 | ! | ! | . ! | į | ! | | | | |
| 63. | ! | İ | ! | ! | ! | ! | | | | |
| 4 | 14 | 0. | ! | ! | ! | ! | | | | |
| 5) | !!!! | | ! | 1 | ī | 1 | | | | |

Biancolella verace

Année: 1982 Emplacement.....1-19.84A4 Désignation.....

| | ! Nombre | ! | DATES | | | | | | | | |
|------|--------------------------|-------|-------|-----|-----------|---|--------|--|--|--|--|
| | ! Total ! d'yeux ! | : 8,3 | ! | 1 | ! | | 1 | | | | |
| A. | 1 | 1 | 1 | 1 1 | ! | ì | ī ī | | | | |
| - 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| A | ! | 1 | 1 | 1 | <u>\$</u> | | 1 | | | | |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ī | 1 | | | | |
| 734 | ! | 1 | ! | Ī | 1 | ! | 1 | | | | |
| | 0 | ! 2 | 1 1 | | <u> </u> | ! | 1 | | | | |
| 4 | . 6 | ! .) | 1 / | ! | 1 | ! | ! | | | | |
| 61 | 1 | 1 | ! | ! | ī | ! | Ī | | | | |
| A | 1 | 1 | - | | ! _7 | | 1 | | | | |
| | 1 | 1 | Į. | 1 | ! 7 | 1 | ī | | | | |

D & 8.38L

Année: 1985
Emplacement....7.1659.... Désignation. Biancolella verace

| | l Nombre ! Total | DATES | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| | ! d'yeux | 1 - 4 1 | . ! ! | !!!! | | | | | | |
| 1 | 1 3 | 111 | 1 1 | !!!! | | | | | | |
| 2 | i parizon | | 1 1 | 1 1 | | | | | | |
| 3 | . 8 | 11. | 1 1 | 1 1 | | | | | | |
| 4 | 1 3 | 11. | 1 1 | 1 1 | | | | | | |
| 5 | 1 3 | | 1 1 | ! 2! | | | | | | |

Dle 1-4-85

ANNEE 1987 HOM Brancolella veracemplacement 7.1659

| Souche | Nbre yeux | | rrement mi/déb | | Ferti- lité | | raison mi/f | n j fin | | raison mi/v | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|---------------------|-----|----------------|------|----------------|---------------|-----|----------------|--------|----------|
| | 4 | 27.3 | 31.3 | 4 | | M.6 | 14.6 | 17.6 | | | | |
| 2 | 3 | 31.3 | 3,4 | 2 | | M.6 | 16,6 | 17,6 | | | | |
| 3 4 5 | | 21.3 27.3 | 3,4 | 4 | | 11.6 | 14.6 | 17,6 | 6.8 | 10.8 | 13.8 | 144 |
| | 16 | , , | 2.4 | 12) | 7,5 | | 14.6 | P. Carlotte . | | Po Vi | et eni | ge Z |

NOM Biancolella verace EMPLACEMENT 7 16 59

| Souche | Nbre yeux | | rrement mi/déb | | Ferti- lité | Flo début | raisor mi/f | | Vé début | raison mi/v | | Maturité |
|--------|--------------|--------|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 1 | 4 | 2.0.2 | 29.3 | 1 | - | | | | | | | |
| 3 / | | | | | 4 | 31.5 | 3.6 | 66 | 1.8 | 4.8 | 8.8 | 4 9. 9. |
| 5 | 5 | 25.3 | | 0 | | | | | | | | |
| - | | Pourri | ture : | 0 | Port : | mi-ery | ν΄ Vi | ueur | : 25 fails | a mon | | +5 |
| - | | | 29,3 | | 1 | | 3,6 | 1 | , , | ~ ~ q | | • • |
| | | | +5 | | | | +3 | | | | | |

| | | 1990 | | | | | ч, | | | | | \ ¹ |
|-----------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|------|----------------|------|----------------|
| N | OM Bra | an coll | ela ve ni | nack | EMPLACE | MENT | 7 10 | 5 5 9 | * | | | |
| Souche | Nbre yeux | | rrement mi/déb | | Ferti- lité | | raison mi/f | | | raison mi/v | | Maturité |
| 1 2 3 4 5 | 43454 | | | | | 18.5 | 21.5 | 23.5 | 16.7 | 13,7 | 23,7 | |
| 0 | rritur | e: v |) | Mill. | : <i>O</i> | Port : | | | V | 7igueu | f: | |

Biancolella verace 7.16 59s-3

DESIGNATION: EMPLACEMENT:

(A) BOURGEOUNDINENT

Colonne

- 41 épanoui O- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneuz 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.

(D) JEUHES FEUILLES DU HAGE

étalées () en gourtière (8) autres 9

- 43 glabres 4 séteuses 5 sloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 6 cotonneuses 9
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 culvrées 4 jaunes 5 à plages bronzees 5 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détaché...

Biancolella verace 7.16 S 9 n.3

Désignation - Emplacement :

Juntanhada

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve on roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) MANGAU MERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

à contour uni 7 - saguleux 8 - côtelé ...

49 - glabre ... à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

borton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphilegiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Biancolella vérace (1.19,840.4) 7.16,89 a.3

Désignation : Emplacement :

Tumpunjunga

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: verte ()- jaune 2 - rouge clair plast 52 - vrille

rouge foncé 4. intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 -- courte 2 - moyenne 3 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Biancolella vérace (1.1954 s.4) 7-1659 s.5

Désignation : Emplacement :

Juntumberte

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférioure : nervures : glabre Q - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan O = on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Segé

lobos: plan — on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyonnement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranócux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

Biancolella vérace (1.19545-4) 7-1659 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 14x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 long 9. 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 52 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 auirrégulière 8. (dimensions : 20 × 18).

27 - De couleur blanc 1 gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9) 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1 / coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenno 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8)- apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3) 31 - A pédicelle de couleur : verte (7) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Amutumbuda

Biancolella verace 7.16 59 A.1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Yeux

Juntanharta

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3), Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (6) saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (5) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - eff-cé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
Désignation: Biancolella verace
   Emplacement: 7.4659
                                   : 1 - 2 - 3
   Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - 6
   Sexe
                                   : 7 - 8 - 9
   L1/L2
                                   : (10) - (11)
   L2/L
                                   : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
   Mombre de lobes
                                   17 - 18 - 19 - 20
   Prof. sinus latéral Sup.
                                  : 21 - 22 - 23 - 24
   Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
   Forme sinus pétiolaire
   Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267)
   Sinus pétiolaire ouvert
   Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39
   Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
   Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                    : 40 - 41
   Dents : forme
                                    : 42 - (43) - 44
   Dents (angle)
                                   : (35) - (16) - 47
   Angle du lobe terminal
   Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
   Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                                   : 60 - 61 - 62
   Angle des nervures L3 L'3
                                   : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
   Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntumhunti

Nº d'ordre :